

### **MR prostaty- przygotowanie:**

- Przed badaniem z podaniem środka kontrastowego:
  - należy być na czczo,
  - wymagany jest wynik poziomu kreatyniny/eGFR we krwi (nie starszy niż 14 dni).
- W przeddzień badania należy pozostać na diecie lekkostrawnej, należy przyjąć 2 kapsułki leku Espumisan 3x na dobę oraz w dniu badania 2 kapsułki leku Espumisan na czczo,
- W dniu badania należy powstrzymać się od palenia papierosów, żucia gumy czy picia kawy- czynności te mogą nasilać perystaltykę, czyli drobne ruchy jelit, które mogą zaburzać uzyskiwany obraz,
- Przed badaniem należy oddać mocz oraz stolec,
- Należy przynieść ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą gruczołu krokowego- wyniki badania poziomu PSA, wyniki USG prostaty lub wyniki poprzednich MR prostaty, biopsji,
- Należy przynieść ze sobą dokumentację dotyczącą obecnych w ciele obiektów metalowych, a także pozostawić inne wykonane z metalu przedmioty przed wejściem do pracowni rezonansu (m.in. zegarek, okulary czy wyjmowana proteza) i włożenie stroju pozbawionego metalowych elementów.