

Kolonoskopia

Badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego aparatu optyczno-cyfrowego do jelita grubego. Pozwalające na obejrzenie przez lekarza wnętrza jelita oraz w razie potrzeby usunięcie zmiany i pobranie materiału do badania histopatologicznego.

Warunkiem przeprowadzenia badania jest właściwe przygotowanie jelita.

Przygotowanie do badania:

Dwa dni przed badaniem należy powstrzymać się od potraw ciężkostrawnych, orzechów, ziaren, chleba wieloziarnistego, owoców i warzyw z nasionami. Zalecana jest dieta płynna: zupy, kisiel, jogurty, kleiki itp.

Dzień przed badaniem od rana bez posiłków, dużo pić (woda, herbata, klarowane jasne soki, można ssać lalandrynki). Przed badaniem należy **bezwzględnie zażyć preparat oczyszczający jelito**. Środek ten dostępny jest w aptece na podstawie recepty, którą wypisuje lekarz kierujący lub lekarz rodzinny

W dniu badania nie jeść.

Dokumenty i badania potrzebne do kolonoskopii:

1. skierowanie na badanie
2. dowód osobisty
3. określona grupa krwi, badanie krzepliwości krwi APTT lub INR (ważne 1 miesiąc)
4. Jeżeli badanie jest w znieczuleniu z anestezjologiem należy mieć wynik: EKG, morfologia, jonogram, grupa krwi i krzepliwość krwi, w chorobach tarczycy wynik badania TSH
5. Proszę o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej, szczególnie poprzedni wynik badania, również wypisy ze szpitala ukazujące historie choroby

Prosimy o dostarczenie w/w wyników badań oraz wypełnionej ankiety anestezjologicznej do gabinetu zabiegowego 216 na **7 dni przed planowanym badaniem**. Badania można dostarczyć również drogą elektroniczną na adres: endoskopie@mediq.pl

2 godziny przed badaniem bez znieczulenia nie pijemy.

Uwaga! Warunkiem wykonania znieczulenia jest:

- zapewniony transport do domu w obecności osoby pełnoletniej
- 6 godzin przed badaniem nie wolno jeść i pić

- nie należy pić alkoholu 24 godziny przed badaniem i 24 godziny po badaniu
- w czasie doby po badaniu nie prowadzić samochodu oraz nie obsługiwać urządzeń mechanicznych
- po badaniu nie należy podejmować ważnych decyzji

Leki:

W dniu badania należy przyjąć leki nasercowe i na nadciśnienie popijając 1-2 łyżki wody.

Nie przyjmować leków na cukrzycę w dniu badania, dopuszczalne jest ssanie landrynek.

Leki rozrzedzające krew (ACARD, POLOCARD) oraz preparaty żelaza odstawić 7 dni przed badaniem.

Leki rozrzedzające krew (SINTROM, ACENOCUMAROL, PLAVIX) odstawić w porozumieniu z lekarzem kierującym zastępując je heparyną drobnocząsteczkową (CLEXAN).

W przypadku rezygnacji z badania prosimy o telefoniczne odwołanie wizyty: 22 774 26 40

Warunkiem przeprowadzenia badania jest podpisanie świadomej zgody na badanie.